



- Луговой А.Е., Потіш Л.А. (в печати): Состояние гнездовой популяции черного аиста в Закарпатской области в конце XX века. - Беркут.
- Портенко Л.А. (1958): Позвоночные Карпат. - Животный мир СССР. М. 14-29.
- Потіш Л.А. (1994): Гніздове поширення куликів в долині р. Уж. - Мат-ли І-ї конф. молодих орнітологів України. Чернівці. 40-42.
- Потіш Л.А. (1995): Матеріали до вивчення орнітофауни басейну р. Тиса. - Тези допов. 49-ї наук. конф., присвяч. 50-річчю біологічного факультету УжДУ (сер. біологія). Ужгород. 73.
- Потіш Л.А., Луговой О.Е. (2002): Зміни у видовому складі птахів урочища "Оток" ("Атак") Закарпатської області. - Наук. вісник Ужгород. ун-ту (сер. біологія). Ужгород. 11: 82-85.
- Сен-Марк Ф. (1977): Социальная природа. М.: Прогресс. 1-435.
- Страуман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: ЛГУ. 1: 1-199; 2: 1-182.
- Fauna ČSSR. Ptáci-Aves / Red. R. Hudec, W. Černý. Praha: Academia, 1977. 21 (2): 1-895.

- Génsbøl B., Thiede W. (1991): Greifvögel (zweite Auflage). München – Wien – Zürich. 1-390.
- Hemetsberger J. (1997): Schwarzstorch *Ciconia nigra*. - Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. Naturschutz Aktuell. Linz. 23.
- Priednieks J., Strazds M. et al. (1989): Latvijas ligzdojošo putnu Atlas 1980–1984. Riga: Zinatne. 1-351.
- Steiner H. (1997): Wespenbussard, Schwarzmilan, Rotfussfalke. - Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. Naturschutz Aktuell. Linz. 36-38, 46-47.
- Tomiałojć L. (1990): Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1-462.



А.Е. Луговой,
ул. Островная, 20/21,
г. Ужгород, 88002,
Украина (Ukraine).

Замітки	Беркут	12	Вип. 1-2	2003	8
---------	--------	----	----------	------	---


О СЛУЧАЯХ ПОДРАЖАТЕЛЬНОГО ХИЩНИЧЕСТВА ОЗЕРНЫХ ЧАЕК НА СКВОРЦАХ

About cases of imitative predation of Black-headed Gulls on Starlings. - I.R. Merzlikin. - Berkut. 12 (1-2). 2003. - Observations were made in Tver region of Russia. A Hooded Crow took out fledglings from a starling-box. A Black-headed Gull from a flock in 5 birds has flown up to the nest and taken out a chick. [Russian].

Наблюдения были проведены в с. Едимово Конаковского р-на Тверской обл. (Россия), расположенном на берегу Ивановского водохранилища на р. Волга. 5–7.07.1991 г. автор был свидетелем, как ежедневно в 10–11 часов серая ворона (*Corvus cornix*), усевшись на торчащую из стенки скворечника присаду, доставала из него оперившихся птенцов скворца (*Sturnus vulgaris*), по одному за раз, и уносила их. На третий день сразу после того, как ворона в очередной раз улетела с птенцом в клюве, от стайки из 5 особей озерных чаек (*Larus*

ridibundus), круживших над огородом, отделилась одна и подлетела к этому скворечнику (располагавшемуся на яблоне в 10 м от огорода). Она уселась на присаду и, не обращая внимания на взрослых скворцов, после непродолжительных усилий вытащила птенца и улетела.

Не вызывает сомнений подражательный характер данной охоты. Это не единственный случай хищничества озерных чаек на птенцах скворцов. Подобная картина наблюдалась там же одним из местных жителей поздней весной 2002 г. Тогда серая ворона три дня подряд таким же образом вытаскивала из скворечника по одному птенцу, а на четвертый день на крышу этого скворечника уселась чайка и пыталась вытащить птенца. Удалось бы ей это сделать, или нет, неизвестно, так как она была застрелена респондентом из ружья.



И.Р. Мерзликин

пр. Лушпы 20/1, кв. 45,
г. Сумы, 40034,
Украина (Ukraine).