



не Светловодского регионального ландшафтного парка. - Мат-ли 1-ї конф. молодих орнітол. України. Чернівці. 64-67.

Митяй И.С. (1983): Расширение ареала черного дятла на Украине. - Вестн. зоол. 4: 86-87.

Червона книга України. Тваринний світ. К.: Укр. енцикл., 1994. 1-464.

Шевцов А.А. (1996): Новые данные о лебеде-шипуне в Кировоградской области. - Мат-ли конф. (7-9 квітня 1996 р., м. Ніжин). К. 47-49.

Шевцов А.О., Вавілін Д.В., Ващенко В.А. (1997): Перше спостереження рожевого шпака на Кіровоградщині. - Беркут. 6 (1-2): 46.

А.О. Шевцов,
вул. Героїв Сталінграду, 19, кв. 26,
м. Олександрія, Кіровоградська обл.,
28008, Україна (Ukraine).



Замітки	Беркут	13	Вип. 1	2004	17
---------	--------	----	--------	------	----

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ВОРОНОВ

Some observations on the territorial behaviour of Ravens. - T.V. Bulat, I.R. Merzlikin. - *Berkut*. 13 (1). 2004. - A pair of ravens constantly attacked white storks foraged on their breeding territory. [Russian].

Известно, что вороны (*Corvus corax*) ревностно защищают свою гнездовую территорию и активно изгоняют всех случайно залетевших птиц – серых ворон (*Corvus cornix*), ястребов, орлов и орланов. Даже таким птицам, как черному (*Ciconia nigra*) и белому (*C. ciconia*) аистам вороны не дают спокойно пролететь мимо (Мальчевский, Пукинский, 1983). Иногда такая защита гнезда приобретает довольно ожесточенный характер.

Именно такое поведение пары воронов нам довелось наблюдать 1–9.05.2003 г. в окрестностях с. Великая Рыбица Сумского р-на Сумской обл. На залитый пойменный луг ежедневно прилетали кормиться до семи белых аистов. Они постоянно подвергались нападению со стороны пары воронов, чье гнездо располагалось в сосняке на коренном берегу. Действия происходили одним и тем же образом.

На каждого пролетающего аиста из сосняка с криком устремлялся ворон, пикировал и начинал клевать в спину. Аист пы-

тался подняться вверх, бросался из стороны в сторону, но ворон не давал ему набрать высоту. Несколько минут спустя к первому ворону присоединялся второй, и они вместе принимались атаковать и клевать аиста. Аист садился на залитый луг, а вороны продолжали кружиться над ним. Как только аист пытался взлететь, они тут же его атаковали. Приблизительно через 10 минут аист прекращал попытки взлететь и около 100 м шел по мелководью на заросший рогозом, тростником и ивняком берег реки Псел. В течение еще 1–2 минут вороны с криками продолжали кружить над ним, а затем улетали в свой сосняк, между тем как аист принимался кормиться. Однажды мы наблюдали, как при приближении воронов аист успел набрать высоту, и те вскоре отстали от него.

Через 5 дней аисты перестали посещать этот берег и переместились для кормежки на 2 км ниже по течению.

ЛИТЕРАТУРА

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. (1983): Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. История, биология, охрана. Л.: ЛГУ. 2: 449-453.

Т.В. Булат, И.Р. Мерзликін



И.Р. Мерзликін,
пр. Лушпы 20/1, кв. 45,
г. Сумы, 40034,
Украина (Ukraine).