



- Vogrin M. (1994): [Gravel pits, nature and we]. (In Slovene with English summary).
- Vogrin M. (1996): [Birds of Vrbje pond in the Lower Savinja valley, and a look at its conservationist complexity]. - *Acrocephalus*. 17: 7-24. (In Slovene with English summary).
- Vogrin M. (1997a): Wintering of Coot, *Fulica atra*, and Moorhen, *Gallinula chloropus*, on Vrbje pond in Lower Savinja valley (Slovenia). - *Riv. Ital. Ornitol.* 67: 183-188.
- Vogrin M. (1997b): Priba *Vanellus vanellus* in mali deževnik *Charadrius dubius* gnezdit v izpraznjenih ribnikih. *Falco*. 12: 48-49.
- Vogrin M. (1999): [Comparison between two different methods for estimating numbers of pairs of the breeding Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*, Common Coot *Fulica atra*, and Common Moorhen *Gallinula chloropus*]. - *Acrocephalus*. 20: 45-49. (In Slovene with English summary).
- Vogrin M. (2002): Breeding success of Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* on fishponds. - *Ornis Svecica*. 12: 203-210.
- Vogrin M. (2003): Foraging and diving patterns of the Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* in a fishpond. - *Ornis Svecica*. 13: 85-91.
- Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. (1995): [The avifauna of the Barycz River valley]. - *Not. Orn.* 36: 5-74. (In Polish with English summary).

| | | | | | |
|---------|--------|----|--------|------|----|
| Замітки | Беркут | 13 | Вип. 1 | 2004 | 30 |
|---------|--------|----|--------|------|----|

ЧОМГА–АЛЬБИНОС В КОЛЛЕКЦИИ ЛЮБИТЕЛЯ

Albino of the Great Crested Grebe in collection of an amateur. - N.P. Knysh. - *Berkut*. 13 (1). 2004. - The bird was bagged in Sumy region (North-East Ukraine) late in 1980s. It has aberrant coloration of plumage: white with light fawn tint. [Russian].

В небольшой таксидермической коллекции М.Л. Андрусенко – жителя с. Коротченко Шосткинского р-на Сумской обл., хранится кустарно изготовленное чучело чомги (*Podiceps cristatus*) aberrантной окраски (фото). Все оперение птицы очень светлое – белое с легким рыжеватым оттенком, интенсивность которого наибольшая на голове (верх головы буроватый, щеки и горло рыжеватые) и кроющих перьях крыла. Клюв и цевки ног желтовато-буроватые, пальцы оливково-серые. По словам владельца чучела, птица была добыта в конце 1980-х гг. в сезон осенней охоты на пойменном озере Хотинь близ с. Тимановка Шосткинского р-на. Держалась она несколько в стороне от стайки из 7 чомг.

Чомги-альбиносы и раньше попадали в поле зрения натуралистов. Например, они есть в фондах Государственного Дарвиновского музея (г. Москва), где хранится зна-



Чомга aberrантной окраски.
Great Crested Grebe with aberrant coloration.

чительное число аномально окрашенных птиц, относящихся к 68 видам (Муцетони, 1987).

ЛИТЕРАТУРА

Муцетони В.М. (1987): Белый ворон и райские птицы. М.: Лесная пром-сть. 1-137.

Н.П. Кныш

*Сумской педуниверситет,
каф. зоологии, ул. Роменская, 87,
г. Сумы, 40002, Украина (Ukraine).*