

ням суцільних рубок на відстані 300 - 400 м від нього. У 1980 р. було знайдено гніздо в урочищі Ханівська дача у 70 кв. Жеревського лісництва. Взимку це дерево було кимось спилане. У наступні роки чорні лелеки неодноразово спостерігалися в урочищі, та гніздо знайдено не було. У Леонівському лісництві виявлене гніздо на старому дубі у 1986 р. У наступні роки воно не займалося. У Макарівському лісництві гніздо знайшли в 1986 р. у 38 кв. У 1987 р. було виявлене гніздо також у 35 кв. Перше впало взимку на землю, а друге птахи більше не займали. Така ж доля й гнізда в 47 кв. У 1988 р. птахи в ньому гніздилися, але в наступні роки воно вже пустувало. В листопаді 1990 р., коли опало листя з дерев, вдалося знайти нове гніздо чорного лелеки у кв. 34. У 1991 р. воно було заселене. За даними працівників лісового господарства і нашими спостереженнями нині можливе гніздування 1-2 пар чорних лелек у Леонівському лісництві і 2 пар у Макарівському. За повідомленням С.А. Матюха у 1991 р. 3 гнізда було в Жеревському лісництві. За роки спостережень у гніздах чорного лелеки відмічалось від 2 до 4 пташенят, в середньому $3,3 \pm 0,2$ ($n = 9$). Всі сім знайдених нами гнізд були збудовані на старих дубах. Приліт чорних лелек спостерігався 8.04 1981 р., 8.04 1982 р., 9.04 1983 р., 12.04 1984 р., 10.04 1985 р., 4.04 1986 р., 11.04 1987 р., 6.04 1989 р., 28.03 1990 р., 2.04 1991 р. Найбільш пізня зустріч восени 21.10 1981 р.

Д.М. Борзаківський

Black Stork nesting in Ivankiv District of the Kiev Region. -
D.M. Borzakivsky. - In 1978 - 1990 were 7 nests discovered. They were all on the old oaks built. The brood size fluctuated from 2 to 4 nestlings, on an average $3,3 \pm 0,2$ ($n = 9$). The arrival was observed from 28.03 to 11.04. The most late observation was 21.10.

ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА У КАНІВСЬКОМУ ПРИДНІПРОВ'І. - Зустрічається лише під час весняного та осіннього перельотів, переважно на островах Дніпра. Восени трапляється частіше. Спостерігалися як поодинокі птахи, так і невеликі зграї. 11.09 1987 р. на внутрішніх водоймах о. Шелестів було відмічено 7 чорних лелек. Весняний проліт починається у кінці березня - першій декаді квітня, осінній - у першій половині серпня. Закінчується проліт у другій - третій декаді вересня. Весною чорні лелеки спостерігаються на щоріку. Осін-

ний проліт останнім часом став регулярним, очевидно, це пов'язано з ростом чисельності виду.

В.М. Грищенко

Black Stork in the Kaniv Pridneprovye. - V.N. Grishchenko. -
This bird species is occurred in the Middle Dnieper region only during the migration, more often in autumn. The spring migration starts in the end of March - first ten-day of April, the autumn migration starts in the first half of August and ends in September.

ДО ПОШИРЕННЯ ЧОРНОГО ЛЕЛЕКИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ. - 16.07 1987 р. С.В. Хоменко бачив одного птаха, що ширяв високо над лісом в урочищі Боромля біля р. Сейм (Конотопський район). У першій половині вересня 1991 р. Л. Давидовський спостерігав виводок з 5 чорних лелек на заплавах луках р. Сейм біля с. Вирівка Конотопського району. За даними В.П. Жежеріна чорний лелека раніше гніздився в лісах на півночі району. 25.05 1989 р. у Микільському лісництві (Сумський район) ми спостерігали поодинокого птаха біля невеликого ставка на дні лісової балки. 26.06 1989 р. в околицях с. Бивкинь Лебединського району на вівсяному полі в заплаві р. Псел було відмічено одного чорного лелеку в зграї з 38 білих, що годувалися на цьому полі. Пізніше цього птаха спостерігали в зграї 14.07 і 21.07. 16.08 білі лелеки ще трималися, але чорного вже не було. 17.09 1989 р. біля с. Уралового Серединобудського району одного пролітного птаха бачив В.Б. Новиков. За його даними 2 пари гніздяться в Старогутському лісництві. По словах А.І. Кривцова одна пара гніздиться в Прудичанському лісництві (Ямпільський район). Поодинокий чорний лелека тримався на заболочених луках біля с. Козацького Конотопського району з 9.09 до 15.09 1990 р.

М.П. Книш

To the Black Stork distribution in the Somy Region. - N.P. Knysh. -
In north of this region are 3 nests known. Some records the Black Storks are described.

ВИПАДОК ВРЯТУВАННЯ МОЛОДЦЮ ЧОРНОГО ЛЕЛЕКИ. - Наприкінці літа 1988 р. в саду біля с. Хідновичі Мостиського району Львівської області діти підібрали молодого чорного лелеку. Він не міг літати, хоча не мав помітних пошкоджень. На тілі знайшли велику кількість паразитів, можливо через те птах був ослаблений. Їх вдалося вивести при допомозі ліків. Лелека не брав іншої їжі окрім свіжої

УДК 598.342 /477/

ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА В УКРАЇНІ / Укл.: В.М.Грищенко, І.В.Скільський. -
Чернівці. 1992. 51с.

Підводяться підсумки проведення операції "Рік чорного лелеки" на території України, наводиться список зареєстрованих місць гніздування, аналізується сучасний стан чисельності цього рідкісного птаха. Подана бібліографія по чорному лелеці в Україні.

Табл. 2. Бібліогр.: 175 назв.

Загальна редакція В.М.Грищенка та І.В.Скільського

Edited by V.N. Grishchenko & I.V. Skilsky

Chernivtsi - 1992